

Klamidije so vrsta zelo majhnih bakterij, spolno se prenaša *Chlamydia trachomatis*. Veljajo za napogostejše SPO, ki jih povzročajo bakterije, vendar tudi njihovo prijavljanje ne poteka redno. Lahko jih uspešno zdravimo.

Prenos

Izključno spolno ali pri porodu

Inkubacija

1 - 3 tedni

Klinični potek

Pri moških povzročijo po približno dvotedenski inkubaciji vnetje sluznice sečnice in kasneje tudi obmodka. Težave so podobne kot pri gonoreji, vendar precej manj izražene. Pojavi se pekoč občutek v sečnici in/ali izcedek, ki je stekleno sluzast in tudi brez zdravljenja izzveni. Drugi simptomi so stalni in se pojavljajo v valovih.

Pri ženskah pride do vnetja sečnice, kanala materničnega vratu, lahko pa tudi do vnetja jajcevodov in okolnega tkiva z zvišano telesno temperaturo in bolečinami v medenici. Kronično vnetje se lahko razširi na medenične organe in posledica je lahko izvenmaternična nosečnost ali sterilnost.

Zdravljenje

Doksiciklin, azitromicin, eritromicin ali ofloksacinom - 7 dni, zapletene okužbe se zdravijo 14 dni.